Inzicht in verwerpingen met de Vruchtbaarheidsanalyse

Vruchtbaarheid · https://www.uniform-agri.com/nl/knowledge-base/uniform/vruchtbaarheid/inzicht-in-verwerpingen-met-de-vruchtbaarheidsanalyse/

Verwerpingen zijn iets waar geen enkel melkveebedrijf mee te maken wil krijgen, maar het blijft belangrijk om ze goed te monitoren.


Veel factoren kunnen invloed hebben op het aantal verwerpingen, zoals hittestress, ziektedruk, veranderingen in het rantsoen en het moment van vaccineren. Wanneer verwerpingen consequent worden ingevoerd, kan UNIFORM deze gebeurtenissen omzetten in waardevolle inzichten over uw veestapel.

In de **Vruchtbaarheidsanalyse** kunt u verwerpingen over verschillende perioden bekijken en groeperen op basis van het **aantal dagen dracht (DCC):**

- Minder dan 90 dagen
- 91 tot 180 dagen
- Meer dan 180 dagen, tot maximaal 260 dagen

Zo kunt u gemakkelijker antwoord krijgen op vragen als:

- Neemt het aantal verwerpingen toe of af?
- In welke fase van de dracht komen de meeste verwerpingen voor?
- Is er iets veranderd in het rantsoen, de omgeving of het moment van vaccineren?
- Komt het voor bij alle koeien of alleen bij bepaalde groepen?



Tip: Net als in de andere onderdelen van het **Vruchtbaarheidsanalyse**-overzicht kunt u op de **[i]** knop klikken om te zien uit welke dieren het totaal bestaat.

Hoe voert u een verwerping in?

UNIFORM doet veel automatisch. Toch is het handig om te weten hoe dit werkt, zodat u trends later met vertrouwen kunt beoordelen.

Een verwerping kan als drachtstatus worden ingevoerd.

Dit kunt u het beste gebruiken wanneer het dier verwerpt, maar **geen nieuwe lactatie start**.

Als de koe **wel** een nieuwe lactatie start, heeft u twee mogelijkheden:


- Voer **Drachtstatus** = **[Verwerpen]** in en voer daarna de afkalving in.
- Of voer alleen de **afkalving** in. UNIFORM telt de verwerping dan, indien van toepassing, automatisch mee in de **Vruchtbaarheidsanalyse.**

Goed om te weten

- Alleen verwerpingen die als **drachtstatus** zijn ingevoerd, kunnen later in de **Lijstgenerator** worden teruggevonden.
- Als een vroege afkalving wordt ingevoerd en het kalf als **[Levend]** wordt geregistreerd, telt dit **niet** als verwerping.
- Als het kalf als **[Dood]** wordt ingevoerd, telt dit, indien van toepassing, mee voor zowel het **DOA-percentage** als het aantal verwerpingen.

- Als de afkalving zonder kalf wordt ingevoerd, start de koe een nieuwe lactatie. De verwerping wordt meegeteld en er wordt geen DOA opgeslagen

Voorbeeld van deze werkwijze




Een kijkje in MyHerd (versie 6)

Sommige veehouders hebben **MyHerd (versie 6)** mogelijk nog niet gezien.

MyHerd is het nieuwere cloudplatform van UNIFORM is het nieuwere cloudplatform van UNIFORM. Veel adviseurs gebruiken het al om bedrijfsgegevens te bekijken die vanuit het managementprogramma op het melkveebedrijf worden geüpload. Hierdoor kunnen gegevens die u in uw huidige programma invoert vanaf elke locatie worden bekeken. Sommige melkveebedrijven kiezen er daarnaast voor om MyHerd naast hun geïnstalleerde 5.4-programma te gebruiken. Zo kunnen zij het nieuwe platform ontdekken en tegelijkertijd blijven werken met het systeem dat ze al kennen.

Vertrouwde rapportages worden vernieuwd in **MyHerd** en er worden nieuwe functies toegevoegd. Daarbij blijft de praktische manier van rapporteren behouden die veel veehouders al kennen.

Hetzelfde rapport, meer inzicht



In deze versie worden verwerpingen afzonderlijk weergegeven als:

- **Geregistreerde** verwerpingen

- **Berekende** verwerpingen

Berekende verwerpingen kunnen bijvoorbeeld situaties omvatten waarin tochtigheden of nieuwe inseminaties worden ingevoerd bij koeien die eerder als drachtig waren geregistreerd.

Zo krijgt u beter inzicht in hoe de cijfers tot stand komen en kunt u de gegevens met meer vertrouwen beoordelen.